



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 797400
E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

02.06.2022 № 10-00-03/13-3894-2022
На № б/н от 12.05.2022

О требованиях к участникам слета
скаутов

КРДОО «Скауты Карелии»
Г.Петрозаводск, пр.А.Невского, д.69

e-mail: nors-r@mail.ru

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия (далее – Управление), рассмотрев запрос о требованиях к участникам массового молодежного мероприятия «Слет скаутов – разведчиков России» с 1 по 7 августа 2022г. информирует, что в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" иммунизация взрослого населения проводится против :

- дифтерии, столбняка – 1 раз в 10 лет вне зависимости от возраста;
- краснухи (женщины до 25 лет), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против краснухи
- гепатита В взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В
- кори (18 и взрослые до 35 лет), а также взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли и др.) не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против кори.

Участники в возрасте до 18 лет, также должны быть привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Указанные прививки проводятся на бесплатной основе в поликлиниках по месту жительства.

В целях профилактики туберкулеза, в соответствии с п.802 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" взрослое население проходит профилактические осмотры (ФЛГ) не реже 1 раза в 2 года.

Для участников до 18 лет может быть оформлена справка ф.079/у, содержащая сведения о профпрививках, группе здоровья, перенесенных инфекционных заболеваниях, а также справка об отсутствии контактов с инфекционными больными и результатами осмотра на педикулез и чесотку.

Также информируем, что на территории 13-ти муниципальных образований республики, в т.ч. Прионежского района и г. Петрозаводска имеется риск заражения клещевым вирусным энцефалитом, в связи с тем, желательно наличие прививки от клещевого энцефалита.

В соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п. 986. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с целью предупреждения случаев заболевания людей инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, проводят:

-расчистку и благоустройство территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных баз и организаций, мест массового отдыха и пребывания населения, а также прилегающих к ней территорий на расстоянии не менее 50 метров.

-противоклещевые акарицидные обработки территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных организаций, мест массового отдыха и пребывания населения, а также прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 50 метров.

992. Неспецифическая профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами, включает следующие мероприятия: противоклещевые мероприятия; меры индивидуальной противоклещевой защиты; информационно-разъяснительная работа с населением.

996. Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами проводятся в соответствии с общими требованиями к проведению дезинсекционных мероприятий в природных очагах инфекционных заболеваний. Допускается использование средств, разрешенных к применению с этой целью, в соответствии с инструкцией по применению. Эффективность нанесения средств обеспечивается использованием соответствующего оборудования.

998. После проведения акарицидных обработок (через 3-5 календарных дней) при благоприятной для активности клещей погоде проводится контроль их эффективности, который необходимо повторить через 15 календарных дней.

Обработка считается эффективной, если численность переносчиков не превышает 0,5 особей на 1 флаго/км или флаго/час.

1001. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обеспечивается:

- уход и удовлетворительное санитарное содержание территории организации, включающее стрижку газонов, уборку листвы и сухой травы, сухостоя, хозяйственного и бытового мусора. Территория считается благоустроенной при отсутствии павшей листвы и сухой травы, веток, валежника, сухостоя, твердых коммунальных отходов (за исключением специально отведенных мест для их временного хранения и утилизации);

- прилегающих территорий от мусора, валежника, сухостоя в радиусе 50-100 м вокруг принадлежащего им участка;

-ограждение территории организации забором, полосой зеленых насаждений или другим естественным способом по периметру. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий;

- организация и проведение акарицидных обработок на принадлежащей им территории за 7 календарных дней до открытия (заезда людей), создавая ширину барьера не менее 50 м по периметру ограждения.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем рекомендовать участникам слета иметь при себе указанные сведения, а также разместить на официальном сайте слета памятку по профилактике клещевых инфекций.

Приложение: памятка о профилактике КЭ на 1-м листе в 1экз.

Врио руководителя



Л.М.Котович



О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА



РОСПОТРЕБНАДЗОР


ЕДИННЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?



- В лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках
- При заносе клещей собаками, кошками или людьми – на одежде, с цветами
- При употреблении в пищу сырого молока и продуктов, приготовленных из него
- При раздавливании клеща или расчесывании места укуса

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ



Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА

КАК ОДЕВАТЬСЯ В ЛЕС


Голову и шею закрывают головным убором, лучше капюшоном

Используйте светлую одежду

Рукава должны быть длинными

Заправьте рубашку в брюки, концы брюк – в носки и сапоги

Используйте отпугивающие средства – репелленты. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ



Нельзя садиться или ложиться на траву



Внимательно осмотрите одежду и тело



Проверьте животных после прогулки



Не заносите в помещение свежесорванные растения

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА

ПО ВОЗМОЖНОСТИ СРАЗУ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ




1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИНЦЕТ



2. ПРОДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ МЕСТО УКУСА



3. ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ



4. ЕСЛИ ОСТАЛАСЬ ЧЕРНАЯ ТОЧКА ОБРАБОТАЙТЕ 5% ЙОДОМ

Снятого клеща доставляют на исследование в микробиологическую лабораторию